



MY WAY TO GROW

Düngesplan
Kokos

Plán hnojení pro kultivaci
s výrobky Coco

Coco
műtrágyázási terv



SUBSTRATES



Cocomix Plus



Coco Brick

MAIN FERTILIZERS

			EC**	ML / 10 LTR	Roots	X-cel	The Missing Link	BN-Zym	Vitasol	Silution
Wachstumsphase Doba růstu Növekedési időszak	9	9	0,9		8	5	6	5	-	2
Beginn Blütephase Počáteční fáze kvetení Virágzás kezdő időszaka	13	13	1,2		7	5	6	5	-	2
	16	16	1,4		5	8	6	5	-	2
	18	18	1,6		-	8	6	5	-	2
Mitte Blütephase Střední fáze kvetení Virágzás középső időszaka	18	18	1,6		-	10	6	5	-	2
	18	18	1,6		-	10	6	5	4	2
	18	18	1,6		-	10	6	5	7	2
Ende Blütephase Závěrečná fáze kvetení Virágzás végső időszaka	16	16	1,4		-	10	6	5	8	2
	<13	<13	1,2		-	10	6	5	10	2
Letzten Woche / Spülén Poslední týden opláchnete Öblítés utolsó héten	-	-	-		-	-	-	5	7	-

STIMULATORS



Tipps Coco

- Bei Verwendung von Coco Forte A+B: Mischen Sie zuerst A, und dann B in das Gefäß.
- Wenn Sie Silution verwenden, geben Sie zuerst Wasser in das Gefäß, dann Silution und rühren Sie gut um. Warten Sie 30 Minuten und mischen Sie dann den Hauptdünger und die Stimulatoren hinzu.
- Stellen Sie den pH-Wert auf $\pm 5,5 - 6,5$ ein.
- Für die besten Ergebnisse empfehlen wir die Verwendung von Cocomix Plus oder Coco Bricks.
- In Gebieten mit weichem Wasser oder bei Verwendung von RO-Wasser wird empfohlen, den Düngemittel-Mix Ca 15 ($\pm 4 \text{ ml./10 Liter}$) und MgO 10 ($\pm 4 \text{ ml./10 Liter}$) zuzusetzen.
- Die Dosierung der Düngemittel kann in Schritten von 10% mehr oder weniger eingestellt werden.
- Bei langblühenden Pflanzen und bei Verwendung von Longflower-Supermix sollte der Zeitpunkt eingehalten werden, und ab der Mitte der Blüte verlängert werden.

** Der EC-Wert von Osmosewasser mit EC 0,0 gemessen.



Longflower
Supermix

Autoflower
Supermix

Tipy Coco

- Při použití Coco Forte A+B: nejprve namíchejte do nádoby A, pak přimíchejte B.
- Pokud používáte Silution, nejprve dejte do nádoby vodu, poté přidejte Silution a dobře zamíchejte. Vyčkejte 30 minut, poté přimíchejte hlavní hnojiva a stimulátory.
- Upravte pH na $\pm 5,5-6,5$.
- Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme použít náš Cocomix Plus nebo Coco Bricks.
- V oblastech s měkkou vodou nebo v případě, že používáte vodu z reverzní osmózy, doporučujeme přidat do směsi hnojiva Ca 15 ($\pm 4 \text{ ml./10 l}$) a MgO 10 ($\pm 4 \text{ ml./10 l}$).
- Dávkování hnojiva lze upravit v krocích po $\pm 10\%$.
- Pro rostliny s dlouhou dobou kvetení a v případě, že používáte Longflower-Supermix, je třeba prodloužit harmonogram ze střední doby kvetení.

** Hodnota EC se měří s vodou z reverzní osmózy s EC 0,0.

Tippek a Coco-hoz

- Coco Forte A+B használata esetén: először keverje el az A-t az edényben, majd keverje bele a B-t is.
- Ha Silution-t használ, akkor öntsé a vizet az adagoló edénybe, majd tegye bele a Silution-t, és alaposan keverje össze. Várjon 30 percet, majd keverje össze a fő műtrágyákat és a stimulátorokat.
- Állítsa be a pH-t $\pm 5,5-6,5$ között.
- A legjobb eredmény elérésében javasoljuk, hogy használja Cocomix Plus vagy Coco Bricks termékünket.
- Lágy víz vagy RO-víz (fordított ozmózis) használata esetén javasoljuk, hogy adjon Ca 15-öt ($\pm 4 \text{ ml./10 liter}$) és MgO 10-ét ($\pm 4 \text{ ml./10 liter}$) a műtrágyakeverékhez.
- A műtrágyák adagolását $\pm 10\%$ -kal tudja beállítani.
- Hosszan virágzó növényeknél és a Longflower-Supermix használata esetén az ütemezést meg kell hosszabbítani a virágzás közepétől.

** Az EC érték fordított ozmózisos vízzel EC 0,0-val mérvé.



SUBSTRATES



Cocomix Plus



Coco Brick

MY WAY TO GROW



Σχέδιο λίπανσης
με Coco



План за торене с
Coco при култивиране



תוכנית דישון: גידול
בתערובת קווקז

MAIN FERTILIZERS

STIMULATORS

			EC**	Roots	X-cel	The Missing Link	BN-Zym	Vitasol	Silution
Периодос анаптусијес Период на растеж Текуща чиниха	9	9	0,9	8	5	6	5	-	2
Ένορξη περιόδου ανθοφορίας Начална фаза на цъфтеж Изходна стадия на цветене	13	13	1,2	7	5	6	5	-	2
	16	16	1,4	5	8	6	5	-	2
	18	18	1,6	-	8	6	5	-	2
Мезот περιόδου ανθοφορίας Средна фаза на цъфтеж Средний период цветения	18	18	1,6	-	10	6	5	-	2
	18	18	1,6	-	10	6	5	4	2
	18	18	1,6	-	10	6	5	7	2
Τελευταιά περιόδος ανθοφορίας Финална фаза на цъфтеж Стадия цветения	16	16	1,4	-	10	6	5	8	2
	<13	<13	1,2	-	10	6	5	10	2
Τελευταιά εβδомάдa ёкспансион Промиване в последната седмица. шеста седмица.	-	-	-	-	-	-	5	7	-

ML /
10 LTR



BIONOVA
PREMIUM FERTILIZERS

Ε Συμβουλές για το Coco

- Κατά τη χρήση Coco Forte A+B: αναμείτε πρώτα το A και έπειτα το B.
- Όταν χρησιμοποιείτε το Silution, προσθέστε πρώτα νερό στο δοχείο, στη συνέχεια το Silution και αναδύστε καλά. Περιμένετε 30 λεπτά και αναμείτε τα βασικά λιπαράτα και τα διγενερικά.
- Ρυθμίστε το pH σε ± 5.5 – 6.5.
- Για βέλτιστο αποτέλεσμα συνιστούμε τη χρήση των προϊόντων μας Cocomix Plus ή Coco Bricks.
- Σε περιοχές με μαλακό νερό ή κατά τη χρήση νερού αντίστροφης δύμωσης συνιστάται η προσθήκη Ca 15 (± 4 ml./10 λίτρα) και MgO 10 (4 ml./10 λίτρα) στο μέγιμα λιπαράταμα.
- Η δοσολογία του βασικού λιπαράταμας μπορεί να έχει απόκλιση ± 10%.
- Σε φυτά μακράς ανθοφορίας και κατά τη χρήση του Longflower-Supermix το σχήμα θα πρέπει να παραπέθει από τη μέση της περιόδου ανθοφορίας.

** Οι τιμές EC μετρώνται σε νερό αντίστροφης δύμωσης με EC 0.0.



Longflower
Supermix



Autoflower
Supermix

Б Полезни съвети за Coco

- Когато използвате Coco Forte A + B, смесете първо A в съда, след което смесете с B.
- Когато използвате Silution, добавете първо вода в съда за подхранване, след което добавяте Silution и разбръкайте добре. Изчакайте 30 минути и след това смесете основните торове и стимулатори.
- Регулирайте pH на ± 5,5 - 6,5.
- За най-добър резултат пропорцичваме да използвате нашия Cocomix Plus или Coco Bricks.
- В райони с мека вода или при използване на вода, пречистена с обратна осмоза, се пропорцичва добавяне на Ca 15 (± 4 ml./10 литра) и MgO 10 (± 4 ml./10 литра) в торната смес.
- Дозировката на торовете може да се регулира на степени от приблизително 10%.
- За растения с дълъг цъфтеж и при използване на Longflower-Supermix, схемата за торене трябва да се удължи от средата на цъфтежа.

** Стойността на EC се измерва с вода с обратна осмоза с EC 0,0.

טיפים לשימוש בקוקו

- בשימוש בקוקו פורטה: 'Α + Β': מוסיפים מעורכבים תחילת את Α במילול ההשקייה, ולאחר מכן מוסיפים מעורכבים את Β.
- בשימוש עם סיליקה (Silution) יש להוציא תחילת מים למכל הזרנה ואחר קר את תזוזה.
- בשימוש עם סיליקה (Silution): יש לנקות תזוזה מים למכל הזרנה ואחר פועל לה מילול ההשקייה, מושך מים ומוסיפים מעורכבים פינימה את דשוני.
- יש לאزن את pH – ל- 6.5 - 5.5 – 5.5.
- לקבלת התוצאות הטובות ביותר בטור או מילויים להשתמש ב- Α και Β Ca 15 (± 4 ml./10 λίτρα) MgO 10 (± 4 ml./10 λίτρα) לתרעיבת הדשוני.
- לקבלת התוצאות הטובות ביותר מים רכים או בשימוש מי אומנתה כווננה, מושך מים ומוסיפים מעורכבים של מילול הדשוני.
- ויתן לדיאלי תמן מינימום הדשוני ב- 10% חותם או פחות.
- עבור צמחים פרוחים וארכובים וכאר משותמים ב- Longflower-Supermix, יש להרחיב את תזוזה המילול הפלרפורטת מעצע.

** ערך ה- EC = מדד בשימוש עם מי אומנתה הפוכה כאשר הערך ערוך מעדן על 0.0



MY WAY TO GROW



SUBSTRATES



Cocomix Plus



Coco Brick

Fertilization plan
Coco cultivation

Bemestingsschema
Kokos

Plan de fertilización
para cultivo en Coco

MAIN FERTILIZERS

STIMULATORS

			EC**	ML / 10 LTR	Roots	X-cel	The Missing Link	BN-Zym	Vitasol	Silution
Growth period Groeiperiode Período de crecimiento	9	9	0,9		8	5	6	5	-	2
Start flowering phase Start bloeiperiode Comienzo (o principio) de floración	13	13	1,2		7	5	6	5	-	2
	16	16	1,4		5	8	6	5	-	2
	18	18	1,6		-	8	6	5	-	2
Mid flowering phase Midden bloeiperiode Mitad floración	18	18	1,6		-	10	6	5	-	2
	18	18	1,6		-	10	6	5	4	2
	18	18	1,6		-	10	6	5	7	2
Last flowering phase Laatste bloeiperiode Fin de la floración	16	16	1,4		-	10	6	5	8	2
	<13	<13	1,2		-	10	6	5	10	2
Rinse last week Laatste week spoelen Enjuagar la última semana	-	-	-		-	-	-	5	7	-



BIONOVA
PREMIUM FERTILIZERS

Tips Coco

- When using Coco Forte A+B: first mix A in the vessel, then mix in B.
 - When using Silution, first add water to the feed vessel, then silution and stir well. Wait 30 minutes, then mix in the main fertilizers and stimulators.
 - Adjust the pH to ± 5.5 – 6.5.
 - For the best results we recommend to use our Cocomix Plus or Coco Bricks.
 - In areas of soft water or when using RO-water, it is recommended to add Ca 15 (± 4 ml./10 liters) and MgO 10 (± 4 ml./10 liters) to the fertilizer mix.
 - The dosage of fertilizers can be adjusted in steps of 10% more or less.
 - For long flowering plants and when using Longflower-Supermix, the schedule should be extended from mid flowering.
- ** EC value is measured with Reverse Osmosis water with EC 0.0.



Longflower
Supermix



Autoflower
Supermix

Tips Kokos

- Bij gebruik Coco Forte A+B: eerst A mengen, daarna B erbij mengen.
 - Wanneer Silution gebruikt wordt, eerst water aan de tank toevoegen, daarna Silution toevoegen en goed roeren. Wacht 30 minuten, daarna de hoofdmeststoffen en stimulatoren mixen.
 - pH stellen naar ± 5.5 – 6.5.
 - Voor optimaal resultaat raden wij aan onze Cocomix Plus of Coco Bricks te gebruiken.
 - In gebieden met zacht water of met gebruik van RO-water, is het aanbevolen Ca 15 (± 4 ml./10 liter) en MgO 10 (4 ml./10 liter) aan de meststoffenmix toe te voegen.
 - De dosering van de hoofdmeststof mag ± 10% aangepast worden.
 - Bij langbloeiende planten en het gebruik van Longflower-Supermix moet het schema verlengd worden vanaf midden bloeifase.
- ** EC waarden zijn gemeten in Osmose water met EC 0.0.

Consejos Coco

- Cuando use Coco Forte A + B: primero mezcle A en el tanque, luego agregue y mezcle B.
 - Cuando use Silution, primero agregue agua al tanque de alimentación, luego Silution y revuelva bien. Espere 30 minutos y luego mezcle los fertilizantes principales y los estimuladores.
 - Ajuste el pH a ± 5.5 - 6.5.
 - Para obtener los mejores resultados, recomendamos utilizar nuestro Cocomix Plus o Coco Bricks.
 - En áreas de agua blanda o cuando se usa agua RO, se recomienda agregar Ca 15 (± 4 ml./10 litros) y MgO 10 (± 4 ml./10 litros) a la mezcla de fertilizante.
 - La dosis de fertilizantes se puede ajustar en pasos de más o menos 10%.
 - Para plantas de floración larga y cuando se usa Longflower-Supermix, el programa debe ser extendido desde mediados de floración.
- ** El valor EC se mide con agua de ósmosis inversa con CE 0.0.



MY WAY TO GROW



SUBSTRATES



Cocomix Plus



Coco Brick

Calendrier de fumure Coco

Piano di fertilizzazione per coltivazione in Cocco

Plano de fertilização Cultivo Coco

MAIN FERTILIZERS

STIMULATORS

			EC**	ML / 10 LTR	Roots	X-cel	The Missing Link	BN-Zym	Vitasol	Silution
Période de croissance Periodo di crescita Período de crescimento	9	9	0,9		8	5	6	5	-	2
Début période de floraison Inizio fioritura Fase inicial de floração	13	13	1,2		7	5	6	5	-	2
	16	16	1,4		5	8	6	5	-	2
	18	18	1,6		-	8	6	5	-	2
Milieu période de floraison Metà fioritura Fase intermédia de floração	18	18	1,6		-	10	6	5	-	2
	18	18	1,6		-	10	6	5	4	2
	18	18	1,6		-	10	6	5	7	2
Dernière période de floraison Fine fioritura Fase final de floração	16	16	1,4		-	10	6	5	8	2
Rincer la dernière semaine Risciacquare l'ultima settimana Lavagem na semana passada	<13	<13	1,2		-	10	6	5	10	2

The most cost-effective fertilizers in the world?

WWW.BIONOVA.NL



FACEBOOK.COM/BIONOVAPREMIUM



INSTAGRAM.COM/BIONOVANUTRIENTS



BIONOVA
PREMIUM FERTILIZERS

Conseils Coco

- En cas d'utilisation de Coco Forte A+B : d'abord mélanger A, puis mélanger B dedans.
- En cas d'utilisation de Silution, d'abord ajouter l'eau dans le récipient, puis ajouter Silution et bien mélanger. Attendez 30 minutes, puis mélanger les engrangis principaux et les stimulateurs.
- Régler le niveau de pH entre env. 5,5 et 6,5.
- Pour un résultat optimal, nous recommandons d'utiliser notre Cocomix Plus ou nos Coco Bricks.
- Dans les régions où l'eau n'est pas calcaire ou en cas d'utilisation d'eau par osmose inverse, il est recommandé d'ajouter Ca 15 (env. 4 ml./10 litres) et MgO 10 (4 ml./10 litres) au mélange d'engrais.
- Le dosage de l'engrais principal peut être modifié d'env. 10 %.
- Avec des plantes à longue floraison et en cas d'utilisation de Longflower-Supermix, le calendrier doit être prolongé à partir du milieu de la phase de floraison.

** Les valeurs CE ont été mesurées dans une eau osmosée avec CE 0,0.



Longflower Supermix



Autoflower Supermix

Consigli Cocco

- Quando si utilizza Coco Forte A+B: Riempire d'acqua il serbatoio di nutrizione, poi aggiungere A mescolando vigorosamente, dopodiché aggiungere B continuando a misciare.
- Se si sta utilizzando Silution, come prima cosa riempire d'acqua il serbatoio dopodiché aggiungere Silution, mischiare con cura la soluzione ed attendere circa 30 min. Infine aggiungere gli altri fertilizzanti, A+B e booster.
- Regolare il pH ± 5,5 – 6,5.
- Per risultati stupefacenti raccomandiamo l'utilizzo del nostro Cocomix Plus o Coco Bricks.
- In zone caratterizzate da acqua morbida o in caso di utilizzo di acqua da Osmosi inversa, si consiglia di aggiungere alla soluzione nutritiva Ca 15 (± 4 ml./10 litri) e MgO 10 (± 4 ml./10 litri).
- Il dosaggio dei fertilizzanti può essere modificato ad intervalli del 10% circa.
- Per piante caratterizzate da un lungo periodo di fioritura e quando si usa Longflower-Supermix, la scheda di coltivazione andrebbe prolungata a partire da metà fioritura.

** Valore EC misurato in soluzione con acqua ad osmosi inversa EC 0,0.

Tips Coco

- Ao usar Coco Forte A+B: primeiro misture A no recipiente, depois misture B.
- Ao usar Silution, primeiro adicione água ao recipiente, depois adicione Silution e mexa bem. Aguarde 30 minutos, depois misture os principais fertilizantes e estimuladores.
- Ajuste o pH para ± 5,5 - 6,5.
- Para obter os melhores resultados, recomendamos o uso do nosso Cocomix Plus ou Coco Bricks.
- Em áreas de água doce ou ao usar água RO, recomenda-se adicionar Ca 15 (± 4 ml./10 litros) e MgO 10 (± 4 ml./10 litros) à mistura de fertilizantes.
- A dosagem de fertilizantes pode ser ajustada em etapas de 10% mais ou menos.
- Para plantas com floração longa e ao usar o Longflower-Supermix, o plano deve ser estendido a partir da fase de floração intermédia.

** O valor EC é medido com água Reverse Osmosis com 0,0 EC.