

	Wochen	Licht pro Tag (stunden)	COCO ml per 10 liters	RHIZO TONIC ml per 10 liters	CANNA ZYM ml per 10 liters	PK 13/14 ml per 10 liters	CANNA BOOST ml per 10 liters	EC+	EC		
Wachstum	<b>Erste Wurzelbildung (3-5 Tage)</b>										
	Befeuchtung des Substrats		<1	18	19(A) 19(B)	40	-	-	-	0.9	1.3
	<b>1. vegetative Phase</b> Pflanze zeigt starkes vegetatives Wachstum										
	0-3 <sup>a</sup>	18	23(A) 23(B)	20	25	-	-	1.1	1.5		
	<b>2. vegetative Phase</b> bis zum Wachstumsstillstand nach Ausbildung der Blütenanlagen oder Fruchtansätze										
	2-4 <sup>b</sup>	12	27(A) 27(B)	20	25	-	20 - 40 <sup>e</sup>	1.3	1.7		
Blüte	<b>1. generative Phase</b> Längenwachstum der Blüten- oder Fruchtstände Pflanze wächst nicht länger in die Höhe										
	2-3	12	34(A) 34(B)	5	25	-	20 - 40	1.6	2		
	<b>2. generative Phase</b> Blüten- oder Fruchtstände werden kompakter (Breite)										
	1	12	38(A) 38(B)	5	25	15	20 - 40	1.8	2.2		
	<b>3. generative Phase</b> Blüten- oder Fruchtstände werden schwerer (Gewicht)										
2-3	12	25(A) 25(B)	5	25	-	20 - 40	1.2	1.6			
<b>4. generative Phase</b> Abreifung der Blüten- oder Fruchtstände											
	1-2	10-12 <sup>c</sup>	-	-	25 - 50 <sup>d</sup>	-	20 - 40	-	0.4		

Produktreihe: COCO  
 Größe des Nährlösungsbehälters: 10 liters  
 Zeitplanung: Normale Düngung  
 Wasser EC: 0.4  
 Dosierungsmaßeinheiten: ml/10 liters  
 Empfohlenen EC-Werte: 5.2 - 6.2 pH: 5.5 - 6.2



Die in der Tabelle angegebenen Richtwerte sind keine verbindlichen Mindest- oder Höchstwerte, können aber unerfahrenen Züchtlern dabei helfen, eine ausgeklügelte Düngestrategie zu entwickeln. Eine optimale Düngestrategie hängt außerdem von bestimmten Faktoren ab, wie z. B.: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Pflanzensorte, Durchwurzelung, Feuchtigkeitsgehalt im Substrat, Bewässerungsstrategie usw.

- a. Die Länge dieser Phase variiert pro Sorte und Pflanzdichte. Mutterpflanzen bleiben bis zum Schluss in dieser Phase (6-12 Monate).
- b. Die Umstellung der Beleuchtungsdauer von 18 auf 12 Stunden variiert pro Sorte. Als Faustregel gilt, dass nach 2 Wochen umgestellt wird.
- c. Den Lichtzyklus reduzieren, wenn die Reifung zu schnell verläuft. Achten Sie auf eine steigende relative Luftfeuchtigkeit.
- d. Die CANNAZYM-Dosierung auf 50 ml/10 Liter verdoppeln, wenn das Substrat wiederverwendet wird.
- e. Standarddosierung 20 ml/10 l. Für mehr Blühkraft auf maximal 40 ml/10 l erhöhen.

- EC-Wert:
  - Der EC-Wert in mS/cm beruht auf EC-Wert von Wasser = 0,0 @ 25°C, pH-Wert: 6,0.
- pH-Wert:
  - Der empfohlene pH-Wert liegt zwischen 5.5 - 6.2
  - Durch Beigabe von pH- kann der EC-Wert erhöht werden.
  - Verwenden Sie sowohl in der vegetativen als auch in der generativen Phase immer pH- Wuchs.